


Неінвазивні тести при ураженнях печінки різної етіології

FIBROLIV



AKTILIV

Неінвазивні тести FibroLiv[©] & AktiLiv[©]
є доступною альтернативою
пункційної біопсії печінки, які
дозволяють визначити активність
запального процесу і ступінь фіброзу
при ураженнях печінки різної етіології

www.medcalc.somee.com

FibroLiv визначає фіброзні зміни в печінці відповідно до шкали METAVIR

- F0 - Фіброз відсутній*
- F1 - Портальний фіброз без утворення септ*
- F2 - Портальний фіброз з окремим септами*
- F3 - Численні портоцентральної септи без цирозу*
- F4 - Цироз*

AktiLiv визначає дистрофічні і запальні зміни в печінці відповідно до шкал:

METAVIR

- A0 – відсутність активності*
- A1 – слабка активність*
- A2 – помірна активність*
- A3 – висока активність*

Knodell ma співаєт.

- 0 – відсутність активності*
- 1-3 – мінімальна активність*
- 4-8 – слабка активність*
- 9-12 – помірна активність*
- 13-18 – висока активність*

Використання простих і доступних лабораторних показників суттєво знижує вартість дослідження по відношенню до зарубіжних аналогів

FibroLiv

- Термін хвороби
- Загальний білок
- Альбумін
- ГГТ
- Креатинін
- Калій
- Протромбіновий індекс
- Еритроцити
- Гемоглобін
- Лейкоцити
- Лімфоцити
- Паличкоядерні нейтрофіли
- Сегментоядерні нейтрофіли
- Моноцити
- Еозінофіли

AktiLiv

- Термін хвороби
- Загальний білок
- Альбумін
- АЛТ
- Протромбіновий індекс
- Еритроцити
- Гемоглобін
- Лейкоцити
- Лімфоцити

FibroLiv & AktiLiv

- Термін хвороби
- Загальний білок
- Альбумін
- АЛТ
- ГГТ
- Креатинін
- Калій
- Протромбіновий індекс
- Еритроцити
- Гемоглобін
- Лейкоцити
- Лімфоцити
- Паличкоядерні нейтрофіли
- Сегментоядерні нейтрофіли
- Моноцити
- Еозінофіли

Дістрофічні і запальні зміни лежать в основі порушень функції печінки і розвитку фіброзу

Показання до застосування

- Хронічні гепатити С і В.
- Хронічні ураження печінки невідомої етіології.
- Гепатити викликані вірусами герпетичної групи (CMV, EB, HSV).
- Моніторинг стану печінки при лікуванні гепатотоксичними препаратами.
- Хронічні захворювання з ураженням різних органів і систем.

Протипоказання до застосування

- Підпечінковий холестаз
- Хронічна або гостра ниркова недостатність
- Прийом непрямих антикоагулянтів
- Зміни формули крові які не пов'язані з ураженням печінки
- Гемоліз

МедЛаб (ТОВ «Медична лабораторія»)

Тел.: +38 (044) 248-87-78, +38 (096) 848-87-78, +38 (073) 284-87-78, www.medlabtest.ua

Лабораторія Др. Рёдгера, MDI.

Адреса: м.Київ, вул. Старонаводницька 13, офіс 48. Тел.: +38 (044) 569-28-28, www.medlab.kiev.ua

Центр Лабораторних Досліджень (ЦЛД)

Адреса: м.Київ, вул.Васильківська 45, корпус 2, офіс 410. Тел.: +38(044) 455-9178, www.cld.in.ua